

いちご「山口ST9号（きららベリー）」の 化学肥料低減栽培に適した施肥法

山口県農林総合技術センター
農業技術部園芸作物研究所

専門研究員 鶴 山 浄 真

1. はじめに

近年、消費者の食料に対する新鮮・安全・安心などのニーズが高まっており、これらに対応した農産物の安定生産が課題となっている。生産現場からは、環境にやさしい農産物を安定生産するための化学肥料および化学農薬の使用を低減する栽培技術の確立が求められている。

本県が育成したイチゴ品種「山口ST9号（きららベリー）：写真1」は、優れた果実品質に加えて、主要病害であるうどんこ病に強い特性を有し

ている。当センターはこれまでに、イチゴ栽培の主要害虫であるハダニ類とアブラムシ類に対する生物資材の利用技術を開発している（東浦ら、2008）。「山口ST9号（きららベリー）」栽培に生物資材の利用技術を導入することで、化学農薬の大幅な使用回数低減が可能となることから、農林水産省の定める特別栽培農産物表示への対応が期待され、化学肥料についても低減技術の確立が求められている。

本稿では、「山口ST9号（きららベリー）」栽培において、慣行栽培と同等の生産性を維持した上で、化学肥料の使用を低減する施肥法の確立に取り組み、一定の成果を得たので報告する。

なお、化学肥料の低減目標は、農林水産省の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき、山口県が定めた慣行レベルの50%以下^{*1}とした。また、山口型高設栽培システム「らくラック」^{*2}での栽培を前提とした。

※1 化学肥料由来の窒素成分量：
10.9kg/10a以下




写真1. 山口ST9号(きららベリー)の果実と草姿

本 号 の 内 容

§ いちご「山口ST9号（きららベリー）」の
化学肥料低減栽培に適した施肥法 1

山口県農林総合技術センター
農業技術部園芸作物研究室

専門研究員 鶴 山 浄 真

§ カキに適した肥効調節型肥料「柿楽ワンタッチ」の開発 6

愛知県農業総合試験場
園芸研究部落葉果樹研究室

主 任 水 谷 浩 孝

※2 山口県農林総合技術センターと(株)サンポリ
(山口県防府市:廃プラスチック再生加工業)
が1999年に共同開発した高設栽培システム
「らくラック」

2. 施肥法の検討

山口型高設栽培システム「らくラック」の慣行栽培における施肥は全量基肥であり、施用窒素成分

対照区は「らくラック」慣行栽培の施肥とした。試験区は、基肥を山口いちご配合のみとして、化学液肥(OKF-1)の追肥を2つの方法で行った(表1)。一方は灌水毎に一定濃度で混入し(濃度一定区)、もう一方は1日当たりの施肥量が同じになるように灌水量に応じて濃度を変更して混入した(量一定区)。

表1. 化学液肥に関する施肥設計

試験区	基肥 (g/株)				追肥 (Nppm)	合計成分量 (g/株)			
	山口いちご配合	エコロング331 140タイプ	BM 重焼燐	けい酸加里		N			
					OKF-1	全量	化学 ¹⁾ 肥料由来	P ₂ O ₅	K ₂ O
濃度一定区	20	—	4	4	45	2.2	1.4 ³⁾	3.1	2.8
量一定区	20	—	4	4	20~90 ²⁾	2.2	1.4	3.1	2.8
対照区 (慣行栽培)	10	20	10	—	—	3.2	2.8	4.7	2.6

- 1) 各試験区の10a当たり施肥量は9.0kg、対照区は17.9kgである。
- 2) 追肥は11月11日から開始し、灌水量に応じて濃度を変更して1日当たり施肥量を一定にした。
- 3) 化学肥料低減目標は、慣行栽培における化学肥料由来の窒素成分量の50%以下である。
1.4g/株の内訳は、山口いちご配合 (0.4g) とOKF-1 (1.0g) である。

の8割以上は緩効性化学肥料(エコロング331:140タイプ)に由来している。そこで本稿では、慣行栽培で用いる有機質基肥(山口有機入りいちご配合:以下、いちご配合)に、化学肥料低減目標を限度として①化学液肥を追肥する方法と、②基肥に初期溶出抑制型の緩効性化学肥料を加えて有機質固形肥料を追肥する方法を検討した。有機質液肥の追肥は、「らくラック」の点滴灌水チューブが目詰まりするため、施肥法として用いなかった。

2つの施肥法における「山口ST9号(きららベリー)」の収量性と施用窒素の動態を明らかにするとともに、経営評価を行うことで、導入に最適な施肥法を検討した。

(1) 栽培試験

ア 化学液肥の追肥法が収量に及ぼす影響

(ア) 材料および方法

センター内ハウス(180m²)に設置した山口型高設栽培システム「らくラック」を用いた。本システム専用培地は、ココピート、バーク堆肥およびロックウール粒状綿を同比率で混合したものである。冬期における栽培ハウス内の気温が8℃を下回らないように、温風暖房機で加温した。

9月下旬定植から5月末までの栽培期間において、化学液肥の混入は11月11日より4月5日まで毎日実施した。

各区における収量および廃液の硝酸態窒素濃度を測定した。

(イ) 結果

廃液の量と硝酸態窒素濃度から算定した1日当たりの硝酸態窒素排出量は、10月~11月には試験区よりも対照区が著しく高いが、12月以降は、同程度で低く推移し、4月以降はほとんど排出されなかった(図1)。月毎に灌水量が異なるため、




図1. 硝酸態窒素排出量の推移(2009年)

濃度一定区と量一定区の追肥窒素量は1月と3月で大きく異なるが(図2), 両区からの窒素排出量は同程度で推移した。

5月末までの総収量は慣行区>量一定区>濃度一定区となり, 濃度一定区は慣行区に対して約1割減収となった(図3)。




図2. 試験区における月別の窒素追肥量(2009年)




図3. 各区の月別収量(2009年)

イ 有機質固形肥料の追肥法が収量に及ぼす影響 (ア) 材料および方法

栽培施設および管理方法はアの項と同様とした。

対照区は「らくラック」慣行栽培の施肥とした。試験区は, 基肥にいちご配合に加えてスーパーNKエコロング180タイプを施用し, 有機固形肥料(くみあい宇部ユーキ100)を追肥して, 窒素成分の全施用量を対照区と同程度とした(表2)。追肥の回数を変えて試験区とし(1回区, 3回区および6回区), 各区における収量および廃液の硝酸態窒素濃度を測定した。

(イ) 結果

廃液の硝酸態窒素濃度から算定した硝酸態窒素排出量は, 対照区では10月から11月にかけてピークとなったが, 試験区では10月は少なく11月がピークとなった。試験区における硝酸態窒素の排出量は, 追肥の分施肥回数が多いほど少なかった(図4)。




図4. 硝酸態窒素排出量の推移(2009年)

表2. 有機質固形肥料に関する施肥設計

試験区	施肥量(g/株)					合計成分量(g/株)				
	基 肥					追 肥	N			
	山口いちご配合	エコロング331 140タイプ	スーパーNKエコロング180タイプ	BM重焼燐	けい酸加里	くみあい宇部ユーキ100	全量	化学 ¹⁾ 肥料由来	P ₂ O ₅	K ₂ O
1回区	10	—	6	5	6	21×1回 ²⁾	3.3	1.4	3.2	2.6
3回区	10	—	6	5	6	7×3回 ³⁾	3.3	1.4	3.2	2.6
6回区	10	—	6	5	6	3.5×6回 ⁴⁾	3.3	1.4	3.2	2.6
対照区	10	20	—	10	—	—	3.2	2.8	4.7	2.6

1) 各試験区の10a当たり施肥量は9.0kg, 対照区は17.9kgである。

2) 追肥日: 11/11

3) 追肥日: 11/11, 1/13, 4/12

4) 追肥日: 11/11, 12/11, 1/13, 2/12, 3/12, 4/12

5月末までの総収量は、対照区よりも試験区で多くなり、追肥回数を多くするほど増加した(図5)。最も多収となった6回区では対照区に対して3割以上増収となった。いずれの区も3月末までの収量は同程度で推移したが、4月以降の収量が大きく異なった。

1回区では、追肥後にガス障害と見られる葉枯れ症状が発生した(写真2)。

(2) 経営評価

これまでの試験結果から、「山口ST9号(きららベリー)」の化学肥料低減技術として最も有望と考えられた施肥法は、基肥にいちご配合に加えてスーパーNKエコロング180タイプを施用し、有機固形肥料を6回に分けて施肥する方法である。本施肥法を実施するには施肥資材および施肥労力が必要となるが、これらを評価に加えても、慣行栽培に対して10a当たりの経営者所得は約70万円増加した(表3)。

3. まとめ

(1) イチゴ「山口ST9号(きららベリー)」の化学肥料低減栽培のための施肥法は、基肥にスーパーNKエコロング180タイプ(6g/株)と山口いちご配合(10g/株)を施用し、有機固形肥料(くみあい宇部ユーク100)を11月以降6回(3.5g/株/月)施用するのが良い。

(2) 本施肥法により、慣行栽培に対して、約3割増収になるとともに、廃液として排出される硝




図5. 各区の月別収量 (2009年)



写真2. ガス障害とみられる葉枯れ症状

表3. 化学肥料低減栽培と慣行栽培の経営試算¹⁾ (山口型高設栽培システム「らくラック」での栽培)

区分		化学肥料低減栽培	慣行栽培	算出基礎	
粗収益	主産物(A)	4,443	3,600	kg単価900円, 図5の単収を用いて算出	
経営費	生産費	肥料費	57	54	表2の施肥法から算出
		労働費 ^{②)}	1,266	1,176	有機固形肥料の追肥労働費は132時間×680円/10a
		共通費用	1,651	1,651	種苗費, 動力・光熱費, 施設維持管理費, 農薬費等
	販売費	875	709	手数料, 運賃, 包装資材費	
合計(B)		3,849	3,590		
利潤 ^② (A-B)		594	10		
経営者所得(①+②)		1,860	1,186		

単位: 千円

1) 前提条件は山口県農業経営指標(平成21年3月発行)に準じた。

2) 労働費には自家労賃も含む。

酸態窒素量が少なくなる。

(3) 本施肥法における化学肥料由来の窒素成分量は9.0kg/10aとなり、化学肥料低減目標（山口県が定める慣行レベルの50%以下：10.9kg/10a以下）を達成できる。


(4) 施肥資材費と労働費を考慮した本施肥法の生産費用は慣行技術と同程度で、増収となることから経営者所得が高まり、採算性は高い。

参 考 文 献

山口県農林総合技術センター平成20年度「新たに普及しうる試験研究等の成果」生物資材を活用した施設イチゴの病害虫防除技術

山口県農林総合技術センター平成22年度「新たに普及に移しうる試験研究等の成果」いちご「山口ST9号（きららベリー）」の「らくラック」栽培での化学農薬・肥料低減技術

作物の生育にマッチした養分の供給! ジェイカムアグリのヨーティング肥料



原 肥		LPコート・エムコート	ロング・エコロング
		尿素	硝酸系化成肥料
主な溶出タイプ	直線型	20、40、70、100、120、140	40、70、100、140、180、270、360
	シグモイド型	30、40、60、80、100、120	70、100、140、180
使 用 場 面		水稲、麦、豆類、野菜など	野菜、花卉、果樹、茶など
主 な 製 品		LPコート複合、エムコート複合	ロング、エコロング、スーパーロング、スーパーエコロング